

由於各地木瓜產區紛紛傳出遭受「秀粉介殼蟲」危害，影響木瓜生產品質及收成，由於該作物蟲害目前尚未有正式核准登記的可用防治藥劑，為此農委會動植物防疫檢疫局快速於9月29日公告增列50%馬拉松乳劑、75%陶斯松水溶性粒劑、20%達特南水溶性粒劑、100g/L 賜派滅水懸劑及99%礦物油乳劑等5種緊急防治藥劑。並籲請農友儘速及加強防治工作，以免疫情擴大。防治藥劑與、使用方法及注意事項請見下表：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
50%馬拉松乳劑 (malathion)	1-2公升	500-1,000	夏秋之交有介殼蟲時開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 採收前3天停止施藥。</li> <li>2. 僅噴及果實與主幹，噴及葉片易發生藥害。</li> <li>3. 使用前應注意疏果。</li> </ol>
75%陶斯松水溶性粒劑 (chlorpyrifos)	0.3-1.0公升 (IRAC 1B)	3,000	害蟲發生時開始施藥。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 採收前12天停止施藥。</li> <li>2. 日本殘留容許量為0.01ppm，請外銷果農小心使用</li> </ol>

20%達特南 水溶性粒劑 (dinotefuran)	0.4-0.5 公斤 (IRAC 4A)	2,000	害蟲發生時開始施藥。	1. 採收前 15 天停止施藥。 2. 日本殘留容許量為 0.01ppm，請外銷果農小心使用
100g/L 賜派滅 水懸劑 (spirotetramat)	0.5-0.7 公升 (IRAC 23)	1,500	害蟲發生時全株均勻施藥一次。	1. 採收前 10 天停止施藥。 2. 日本殘留容許量為 0.01ppm，請外銷果農小心使用
99%礦物油 乳劑 (petroleum oil)	2.5-10 公升	200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次	

備註：陶斯松、達特南及賜派滅等 3 種藥劑使用方法參考番荔枝太平洋臀紋粉介殼蟲或粉介殼蟲類；馬拉松及礦物油 2 種藥劑使用方法參考木瓜軟介殼蟲類、盾介殼蟲類。