

## 豆菜類病蟲害用藥

周浩平 2012.1.31 更新

藥劑名稱	作用機制代碼	防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期	台灣安全容許量(PPM)	同時核准使用於防治其他作物之病蟲害
▲50%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A	豆莢螟	1000	7	豆菜 0.5	十字花科蔬菜(擬尺蠖、黃條葉蚤)、大豆(斜紋夜蛾、南方綠椿象、白緣螟蛾)、水稻(褐飛蝨、黑椿象、黑尾葉蟬)、玉米(玉米螟)、甘藷(蝦殼天蛾)、柑桔(椿象類)、茶(小白紋毒蛾、茶毒蛾、茶捲葉蛾、避債蛾類、茶蠶、葉蟬、尺蠖蛾類、刺蛾類、燈蛾類)、棉花(棉鈴蟲、二點小綠葉蟬、蚜蟲)、番茄(番茄夜蛾)、菸草(鱗翅目害蟲)、落花生(小綠葉蟬)
▲85%加保利可濕性粉劑	IRAC 1A		1700	7		十字花科蔬菜(擬尺蠖、黃條葉蚤)、大豆(斜紋夜蛾、南方綠椿象、白緣螟蛾)、水稻(稻蝨類、椿象、葉蟬、薊馬類)、玉米(玉米螟、條背土蝗)、甘藷(蝦殼天蛾)、柑桔(椿象類)、茶(小白紋毒蛾、茶毒蛾、茶捲葉蛾、避債蛾類、茶蠶、葉蟬、尺蠖蛾類、刺蛾類、燈蛾類)、棉花(棉鈴蟲、二點小綠葉蟬、蚜蟲)、番茄(番茄夜蛾)、菸草(鱗翅目害蟲)、落花生(小綠葉蟬)、印度棗(小白紋毒蛾及台灣黃毒蛾)、香蕉(花編蟲、粉介殼蟲)、荔枝(荔枝癭蚧、荔枝細蛾)、番石榴(黑疣粉蝨)、芒果(葉蟬、螟蛾)

★2.8%畢芬寧乳劑	IRAC 3A	蚜蟲	1000	3	豆菜 1.0	十字花科蔬菜斜紋夜蛾、小葉菜類粉蝨類及夜蛾類、甘藍紋白蝶、豆菜類薊馬類及蚜蟲類、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨、茄子棉蚜及二點小綠葉蟬、香蕉薊馬類、楊桃、蓮霧葉蟬類、蔥甜菜夜蛾
★2.5%畢芬寧水懸劑	IRAC 3A		1000	3		十字花科蔬菜斜紋夜蛾、小葉菜類粉蝨類及夜蛾類、甘藍紋白蝶、豆菜類薊馬類及蚜蟲類、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨、茄子棉蚜及二點小綠葉蟬、香蕉薊馬類、楊桃、蓮霧葉蟬類、蔥甜菜夜蛾
★25%福化利乳劑	IRAC 3A	薊馬	3000	7	豆菜 0.5	瓜果類薊馬、菊花蚜蟲、蜜蜂蜂蟹蟎、蔥科蔬菜葉部薊馬
★2.9%貝他-賽扶寧乳劑	IRAC 3A		1500	9	豆菜 0.5	水稻稻螟蛉、瘤野螟、台灣夜盜、樹蔭蝶；西瓜南黃薊馬、蔥科蔬菜葉部薊馬類、芒果葉蟬
2.5%賜諾殺水懸劑	IRAC 5		1000	3	豆菜 0.3	十字花科蔬菜（螟蛾類、植食性瓢蟲類、夜蛾類、紋白蝶、小菜蛾）、茄科作物（葉部薊馬）、蔥科蔬菜（葉部薊馬）
■43%佈飛松乳劑	IRAC 1B		800	10	豆菜 1.0	十字花科蔬菜（黃條葉蚤、小菜蛾）、山藥（葉部薊馬類）、瓜類（葉部薊馬、金花蟲類）、甘藷（金花蟲類、象鼻蟲類）、茄科作物（葉部薊馬）、蔥科蔬菜（根蟎類、葉部薊馬）、蕹菜（金花蟲類、象鼻蟲類）、蘆筍（金花蟲類）
■10%美文松乳劑	IRAC 1B		350	3	豆菜 0.2	十字花科蔬菜（黃條葉蚤、斜紋夜蛾、大菜

10%美文松溶液						螟、小菜蛾、紋白蝶、菜心螟、蚜蟲)、茶(小白紋毒蛾、茶蠶、茶避債蛾、茶捲葉蛾、黑點刺蛾、尺蠖蛾類、茶毒蛾)、菊花(薊馬類、蚜蟲類)
●28.8%益達胺溶液	IRAC 4A	粉蝨	4500	21	豆菜 0.5	毛豆、冬瓜、洋香瓜、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨；水稻斑飛蝨、褐飛蝨；瓜類、蔥科蔬菜葉部薊馬；瓜類粉蝨、印度棗薊馬類；西瓜、茄子、花胡瓜南黃薊馬；亞洲棕櫚象鼻蟲、玫瑰蚜蟲、柿斜紋夜蛾、薊馬類；茶黃薊馬、小綠葉蟬、柑桔刺粉蝨、筴白筍長綠飛蝨、梨木蝨、捲葉蚜、番荔枝姬黃薊馬；蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾；薔薇科果樹薊馬類、芒果綠葉蟬
●9.6%益達胺溶液	IRAC 4A		1500	9		毛豆、冬瓜、洋香瓜、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨；水稻斑飛蝨、褐飛蝨；瓜類、蔥科蔬菜葉部薊馬；瓜類粉蝨、印度棗薊馬類；西瓜、茄子、花胡瓜南黃薊馬；亞洲棕櫚象鼻蟲、玫瑰蚜蟲、柿斜紋夜蛾、薊馬類；茶黃薊馬、小綠葉蟬、柑桔刺粉蝨、筴白筍長綠飛蝨、梨木蝨、捲葉蚜、番荔枝姬黃薊馬；蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾；薔薇科果樹薊馬類、芒果綠葉蟬

●9.6%益達胺水懸劑	IRAC 4A		1500	9		毛豆、冬瓜、洋香瓜、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨；水稻斑飛蝨、褐飛蝨；瓜類、蔥科蔬菜葉部薊馬；瓜類粉蝨、印度棗薊馬類；西瓜、茄子、花胡瓜南黃薊馬；亞洲棕櫚象鼻蟲、玫瑰蚜蟲、柿斜紋夜蛾、薊馬類；茶黃薊馬、小綠葉蟬、柑桔刺粉蝨、筊白筍長綠飛蝨、梨木蝨、捲葉蚜、番荔枝姬黃薊馬；蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾；薔薇科果樹薊馬類、芒果綠葉蟬
25%派滅淨可濕性粉劑	IRAC 9B		2000	21	豆菜 0.5	瓜類蚜蟲類、粉蝨類、胡瓜棉蚜；毛豆銀葉粉蝨；水稻褐飛蝨；瓜菜類粉蝨；洋香瓜銀葉粉蝨；筊白筍長綠飛蝨；檬果葉蟬
20%畢達本可濕性粉劑	IRAC 21A	葉蟎	3000	14	四季豆 0.4	果菜類二點葉蟎、枇杷葉蟎、柑桔（銹蟎、柑桔葉蟎）、茄子（二點葉蟎）、茶（葉蟎）、梨果類（葉蟎類）、番荔枝（神澤氏葉蟎）
■50%馬拉松乳劑	IRAC 1B	夜蛾類、毒蛾類	500	4	豆菜 2.0	十字花科蔬菜、柑桔、金針、玫瑰、菸草等作物上防治蚜蟲類害蟲；柑桔、木瓜、蘇鐵等作物上防治介殼蟲類害蟲；十字花科蔬菜、柑桔、番茄、稻穀上防治蛾類害蟲；蔥薺上防治薊馬；番荔枝上防治神澤氏葉蟎
★2.8%賽洛寧乳劑	IRAC 3A	螟蛾類、毒	2000	3	豆菜 1.0	十字花科蔬菜紋白蝶、斜紋夜蛾
★2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC 3A	蛾類及夜蛾	2000	3		水稻瘤野螟、牛蒡、芹菜、仙草、豆菜、胡

★2.46%賽洛寧膠囊懸著液	IRAC 3A	類	2000	3		蘿蔔、馬鈴薯、茄果類、蕹菜、菠菜、菊科葉菜類夜蛾瓜果類、印度棗、枇杷、柿、番石榴、碗豆、薔薇科果樹薊馬、西瓜南黃薊馬；豆菜類、茄科果菜毒蛾；枇杷小白紋毒蛾、柑桔潛葉蛾、茄子二點葉蟎、茄果類植食性瓢蟲；桃、梨果類葉蟬；茶小綠葉蟬、梨果類蚜蟲、莧菜、蕹菜、紫蘇葉蟎類；菜豆番茄斑潛蠅、葫蘆科瓜果夜蛾、植食性瓢蟲、金花蟲類；葉用甘藷夜蛾類、天蛾類、烏羽蛾類；葡萄咖啡木蠹蛾、紅火蟻、蔬菜番茄夜蛾；蔥科蔬菜葉部薊馬類、碗豆花薊馬、蕹菜小金花蟲、芒果葉蟬、羅勒葉蟎、夜蛾類；蘆筍夜蛾、毒蛾類（2.8%賽洛寧乳劑未推薦用於防治蘆筍夜蛾類、毒蛾類）
■5%二硫松粒劑	IRAC 1B	根潛蠅、莖潛蠅	—	—	豆菜 0.1	大豆潛蠅類、神澤氏葉蟎、蚜蟲；水稻褐飛蟲、黑尾葉蟬；芥菜偽菜蚜；長豇豆赤葉蟎、莖潛蠅、蚜蟲、根潛蠅；棉花二點小綠葉蟬、蚜蟲；蔥潛蠅
■10%福瑞松粒劑	IRAC 1B		—	—	豆菜 0.05	大豆蚜蟲、神澤氏葉蟎、潛蠅類；甘蔗地下害蟲；豆類莖潛蠅；根潛蠅；豆蚜；香蕉花薊馬；棉花二點小綠葉蟬、蚜蟲；蔥潛蠅
甜菜夜蛾核多角體病毒水懸劑	—	甜菜夜蛾	3000	—	—	蔥科蔬菜甜菜夜蛾

10%克凡派水懸劑	IRAC 13		1000	18	豌豆 0.5	十字花科蔬菜小菜蛾、小葉菜類、胡蘿蔔夜蛾、山藥黑盲椿象洋香瓜南黃薊馬、韭菜、芒果薊馬類；茶葉蟎類、梨二點葉蟎、番茄、葡萄、茼蒿夜蛾
▽75%賽滅淨可溼性粉劑	IRAC 17	斑潛蠅	6000	7	豆菜 1.0	十字花科蔬菜、小葉菜類、豆菜、瓜果類潛蠅類
▽8.9%賽滅淨溶液	IRAC 17		1000	7		
33%鋅錳乃浦水懸劑	FRAC M3	銹病	400	12	豆菜 2.5	檬果、蓮霧、楊桃、番石榴炭疽病；水稻稻熱病、胡麻葉枯病；香蕉葉斑病、葉黑星病、炭疽病
38%白列克敏水分散性粒劑	白克列 FRAC 7 百克敏 FRAC 11		1500	9	豆菜 白克列 1.0 百克敏 0.5	木瓜炭疽病、印度棗白粉病、香瓜蔓枯病、梨黑星病、葡萄晚腐病
30%三得寧乳劑	三得芬 FRAC 5 賽福寧 FRAC 3		1000	4	豆菜 三得芬 1.0 賽福寧 0.5	韭菜銹病
50%脫克松可濕性粉劑	FRAC 14	豌豆立枯病	—	—	—	洋香瓜黑點根腐病
◆24.9%待克利乳劑	FRAC 3	四季豆角斑 病	3000	3	豆菜 1.0	水稻紋枯病；草莓、西瓜、菱角炭疽病；長豇豆白粉病、煤黴病；洋香瓜蔓枯病；香蕉葉黑星病；桃菌核病；茶赤葉枯病；蒜紫斑病
◆24.9%待克利水懸劑	FRAC 3		3000	3		
◆23%三泰隆乳劑	FRAC 3	豇豆煤黴病	3000	3	豆菜 2.0	小葉菜類葉枯病、葉斑病，檬果、瓜果類白粉病
◆23%三泰隆水分散性乳劑	FRAC 3		3000	3		
◆5%三泰隆可濕性粉劑	FRAC 3	白粉病	2000	3		瓜果類、胡蘿蔔、桃、葡萄等作物白粉病

◆10.5%平克座乳劑	FRAC 3		4000	6	豆菜 0.5	檬果、木瓜、印度棗、枇杷、胡瓜、香瓜、梨果類、菸草、葡萄、洋香瓜白粉病
84.2%三得芬乳劑	FARC 5		3500	9	豆菜 1.0	小麥、葫蘆科瓜菜類白粉病；韭菜銹病；茶（茶餅病、枝枯病）
50%白克列水分散性粒劑	FRAC 7		2500	9	豆菜 1.0	瓜類白粉病，香蕉黑星病
99%礦物油乳劑	—		500	—	—	牛蒡、瓜類、茄科蔬菜、草莓白粉病；茶（葉蟎類）；芒果、梨木蝨
50%枯草桿菌	—		800	—	—	蓮霧果腐病、胡瓜露菌病、番荔枝果腐病、芒果蒂腐病
23%亞托敏水懸劑	FRAC 11	露菌病、疫病、炭疽病	2000	14	毛豆 0.5	蓮霧炭疽病；十字花科蔬菜、小葉菜類、毛豆、菠菜、菊科蔬菜、葡萄、蔥科蔬菜、菊科蔬菜、瓜類露菌病；木瓜、印度棗、毛豆、荔枝、番石榴、芒果、酪梨炭疽病；木瓜疫病、瓜類蔓枯病、柑桔瘡痂病；韭菜、蔥紫斑病、香蕉黑星病、馬鈴薯晚疫病、梨輪紋病、番茄晚疫病、百慕達草皮褐斑病

備註：藥劑名稱前方之圖案相同者代表具有相同作用機制，應避免同時使用，也避免輪替使用。