

印度棗病害用藥

高雄區農業改良場 曾敏南 整理 0905 修訂

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
▲34.5%貝芬菲克 利水懸劑	FRAC1, B1 FRAC3, G1	白粉病	4,000	6	3.0 0.5	椀果炭疽病、梨黑星病、落花生冠腐病
50%白克列水分散 性粒劑	FRAC7, C2	白粉病	2,500	21	2.5	瓜類、豆菜類、豆類白粉病，香蕉黑星病
●38%白列克敏水 分散性粒劑	FRAC 11, C3 FRAC 7, C2	白粉病	1,500	21	1.0 2.0	
●50%三氟敏水分 散性粒劑	FRAC 11, C3	白粉病	5,000	21	0.5	瓜類 蔓枯病，蓮霧、番石榴、楊桃、椀果炭疽病，蓮霧果腐病，蔥銹病
★40%克熱淨 (烷苯磺酸鹽可濕 性粉劑)	FRAC M7	白粉病	1,000	6	0.2	枇杷灰斑病、柑桔貯藏性病害、葡萄銹病
■23%三泰隆水分 散性乳劑	FRAC3, G1	白粉病	3,000	15	1.0	小葉菜類葉枯病、葉斑病，椀果、瓜果類白粉病
■40%邁克尼可濕 性粉劑	FRAC3, G1	白粉病	6,000	6	0.5	瓜菜類及瓜類白粉病、柿角斑病 不得添加展著劑，避免藥害
■37%護砂得乳劑	FRAC3, G1	白粉病	8,000	9	0.2	
■20.8%比芬諾乳 劑	FRAC3, G1	白粉病	4,000	6	0.5	香蕉葉黑星病、葡萄白粉病
■10.5%平克座乳 劑	FRAC3, G1	白粉病	3,000	6	0.2	木瓜、豆菜類、瓜類、椀果白粉病
■5%菲克利水懸劑	FRAC3, G1	白粉病	3,000	6	0.5	水稻紋枯病、蔥科蔬菜類銹病、落花生銹病、胡瓜白粉病

35.15%銅合硫磺水懸劑	FRAC-M2, FRAC-M1	白粉病	600	6	未訂	*延申使用
▲50%免賴得可濕性粉劑	FRAC1 ,B1	輪斑病	1,500-3,000	6	3.0	水稻稻熱病及紋枯病、瓜類白粉病、香蕉葉斑病
●23%亞托敏水懸劑	FRAC11,C3	炭疽病	3,000	9	0.5	毛豆、瓜類及果樹之炭疽病、毛豆及瓜類露菌病、十字花科與小葉葉類露菌病
純白鏈黴菌素 700 PCU/g 水溶性粉劑	category-F	疫病	800	6	未訂	*延申使用
●50%三氟敏水分散性粒劑	FRAC-11	銹病	6000	18	未訂	*延申使用
★25%克熱淨溶液	FRAC-M7	銹病	800	6	未訂	*延申使用

備註：藥劑名稱前方之圖案相同者代表具有相同作用機制，應避免同時使用，也避免輪替使用。