

印度棗蟲害用藥

高雄區農業改良場 曾敏南 整理 0905 補充

藥劑名稱	作用機制代碼	核准防治病蟲害	稀釋倍數	安全採收期(天)	台灣安全容許量(PPM)	本藥劑同時核准使用於其他作物之病蟲害防治
★20%達特南水溶性粒劑	IRAC-4A	介殼蟲、薊馬	3,000	9	0.5	十字花科蔬菜及毛豆粉蝨類害蟲、水稻褐飛蟲
100g/L 賜派滅水懸劑	IRAC-23	介殼蟲	2,000	6	尚未訂定	
●40.8%陶斯松乳劑	IRAC-1B	介殼蟲、蚜蟲 薊馬	2,000	9	0.5	甘藷蟻象、十字花科蔬菜切根蟲、水稻飛蝨類及螟蛾類害蟲
●40.8%陶斯松水基乳劑	IRAC-1B	薊馬	1,500	9	尚未訂定	*延申使用
▲85%加保利可濕性粉劑	IRAC-1A	小白紋毒蛾 台灣黃毒蛾	1,700	9	1.0	水稻飛蝨類及薊馬類害蟲、十字花科蔬菜黃條葉蚤
▲40%納乃得水溶性粒劑	IRAC-1A	小白紋毒蛾 台灣黃毒蛾	1,500	6	0.5	大豆椿象類及蛾類害蟲、水稻飛蝨類、椶果葉蟬
▲25%納乃得水溶性粉劑	IRAC-1A	小白紋毒蛾 台灣黃毒蛾	900	6	0.5	同上
■2.8%第滅寧水基乳劑	IRAC-3A	小白紋毒蛾 台灣黃毒蛾 薊馬	1,000	9	0.5	十字花科蔬菜及水稻螟蛾類、小葉菜類蚜蟲、印度棗蛾類及薊馬類、番石榴粉蝨及薊馬類
■2.8%第滅寧乳劑	IRAC-3A	小白紋毒蛾 台灣黃毒蛾 薊馬	1,000	9	0.5	同上
■2.4%第滅寧水懸劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	尚未訂定	*延申使用

●22.5%陶斯松乳劑	IRAC-1B	小白紋毒蛾 台灣黃毒蛾	1,000	9	0.5	甘藷甘藷蟻象、甘藷猿葉蟲 十字花科蔬菜切根蟲 水稻褐飛蟲、黑尾葉蟬、稻螟蛉、台灣夜盜 番石榴及蓮霧粉介殼蟲、薊馬類
◆10%得芬瑞可濕性粉劑	IRAC-21A	柑桔葉蟎	3,000	6	1.0	木瓜、柑橘及番石榴蟎類
15%亞醜蟎水懸劑	IRAC-20B	柑桔葉蟎	1,500	6	0.1	西瓜蟎類
30%賜派芬水懸劑	IRAC-23	柑桔葉蟎	2,500	15	5.0	木瓜、柑橘蟎類
1%密滅汀乳劑	IRAC-6	柑桔葉蟎	1,500	6	0.2	十字花科蔬菜 蚜蟲類、木瓜及瓜菜類蟎類
◆15%芬殺蟎水懸劑	IRAC-21A	柑桔葉蟎	2,000	6	0.5	木瓜、柑橘蟎類
10%依殺蟎水懸劑	IRAC-10B	柑桔葉蟎	3,500	3	0.2	木瓜、西瓜蟎類
50%芬佈賜可濕性粉劑	IRAC-12B	葉蟎類	1,500	10	尚未訂定	*延申使用
■2.5%賽洛寧微乳劑	IRAC-3A	夜蛾類、毒蛾類、蚜蟲、薊馬	1,000	6	尚未訂定	*延申使用
■2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	IRAC-3A	夜蛾類、毒蛾類、蚜蟲、薊馬	1,000	6	尚未訂定	*延申使用
■2.8%賽洛寧乳劑	IRAC-3A	夜蛾類、毒蛾類、蚜蟲、薊馬	1,000	6	尚未訂定	*延申使用
★28.8%益達胺溶液	IRAC-4A	薊馬	4,500	9	尚未訂定	*延申使用
★9.6%益達胺溶液	IRAC-4A	蚜蟲、薊馬	3,000	9	尚未訂定	*延申使用

★9.6% 益達胺水懸劑	IRAC-4A	薊馬	1,500	9	尚未訂定	*延申使用
●30% 裕必松可濕性粉劑	IRAC-1B	蚜蟲	1,000	15	尚未訂定	*延申使用
10% 克凡派水懸劑	IRAC-13	薊馬	1,500	15	尚未訂定	*延申使用
★16% 可尼丁水溶性粒劑	IRAC-4A	薊馬	3,000	9	尚未訂定	*延申使用
★20% 亞滅培水溶性粉劑	IRAC-4A	薊馬	4,000	6	尚未訂定	*延申使用
▲40% 丁基加保扶可濕性粉劑	IRAC-1A	薊馬	1,200	15	尚未訂定	*延申使用
▲48.34% 丁基加保扶乳劑	IRAC-1A	薊馬	1,200	15	尚未訂定	*延申使用
■10% 亞滅寧乳劑	IRAC-3A	薊馬	3,000	6	尚未訂定	*延申使用
■10% 亞滅寧水懸劑	IRAC-3A	薊馬	3,000	6	尚未訂定	*延申使用
■3% 亞滅寧水基乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	尚未訂定	*延申使用
■3% 亞滅寧乳劑	IRAC-3A	薊馬	1,000	6	尚未訂定	*延申使用

備註：藥劑名稱前方之圖案相同者代表具有相同作用機制，應避免同時使用，也避免輪替使用。