

# 輸日木瓜病蟲害防治用農藥參考基準

資料彙整：農委會動植物防疫檢疫局

Ver. 1.3 (95.04.03 初版)

Ver. 2.0 (97.07.18 修訂)

一、臺日雙方皆訂有殘留容許量且我國標準與日本相等或較嚴之藥劑種類

※請農友施藥時遵守我國規定之安全採收期

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
炭疽病	福賽快得寧	50 2.0	20 2.0	6	福賽得 快得寧
	甲基鋅乃浦	5.0	2.5	9	
	亞托敏	2.0	1.0	9	
白粉病	貝芬依滅列	3.0 2.0	1.0 1.0	6	貝芬替 依滅列
	快得保淨	2.0 3.0	2.0 1.0	18	快得寧 甲基多保淨
	免賴得	3.0	1.0	18	
	賽福寧	2.0	0.5	未訂	
	蟎離丹	5.0	0.1	未訂	可兼防葉蟎
疫病	純白鏈黴素	0.05	免訂	—	
	亞托敏	2.0	1.0	9	
蒂腐病	依普同	10	2	21	
缺硼症	硼砂 (硼酸)	未定	—	—	微量元素
赤圓介殼蟲	馬拉松	1.0	1.0	3	
	滅大松	0.2	0.1	9	
赤葉蟎	畢汰芬	0.2	0.1	6	
神澤氏葉蟎	依殺蟎	0.5	0.2	3	
	合芬寧	0.5	0.5	6	
	密滅汀	0.2	0.2	6	
	芬普寧	2.0	1.0	9	
	賜派芬	2.0	0.5	6	
蚜蟲	益達胺	1.0	0.5	6	

## 二、日本殘留容許量較我國嚴苛者：

### ※欲生產輸日木瓜者應避免使用

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
炭疽病	賽普護汰寧	5 *	1 1	9	賽普洛 護汰寧
白粉病	平克座	0.05	0.5	3	
疫病	嘉賜銅	0.01 —	未訂 —	6	嘉賜黴素 鹼性氣氧化銅
	賽座滅	*	0.5	12	
	達滅芬	*	1	9	
赤葉蟎	克芬蟎	0.02	2.0	15	
神澤氏葉蟎	芬殺蟎	*	0.5	12	

### ※雜草用藥請謹慎使用，勿噴及作物

作用對象	藥劑名稱	日本 (ppm)	臺灣 (ppm)	我國規定之 安全採收期 (天)	備註
雜草	固殺草	0.05	0.1	未定	勿噴及作物

註：

—：免訂殘留容許量(exempted substances)

\*：統一基準《uniform limit, 0.01ppm 或偵測限值(LOD)》

註：如有最新修正資訊請參考下列網站：

1. 日本食品中殘留農藥之安全容許量基準值請參考厚生勞動省網站  
(<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/index.html>)
2. 我國殘留農藥安全容許量請參考衛生署網站  
(<http://food.doh.gov.tw/Chinese/Ruler/Ruler.asp?idCategory=128&nowpage=3>)
3. 我國農藥推薦使用請參考行政院農委會動植物防疫檢疫局農藥資訊服務網站  
([http://pesticide.baphiq.gov.tw/register\\_3.aspx](http://pesticide.baphiq.gov.tw/register_3.aspx))
4. 病蟲害防治技術問題請洽行政院農業委員會茶業改良場

修正版本說明：

1. 增列疫病防治藥劑「純白鏈黴素」、「亞托敏」、「達滅芬」及「賽座滅」等4種；增列蒂腐病防治藥劑「依普同」1種；增列白粉病防治藥劑「蟎離丹」1種；增列炭疽病防治藥劑「賽普護汰寧」1種。
2. 增列神澤氏葉蟎防治藥劑「賜派芬」1種。