

蓮霧蟲害用藥

周浩平 2012.1.31 更新

| 藥劑名稱 | 作用機制代碼 | 防治病蟲害 | 稀釋倍數 | 安全採收期 | 台灣安全容許量(PPM) | 同時核准使用於防治其他作物之病蟲害 |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--|
| ★16%可尼丁水溶性粒劑 | IRAC 4A | 腹鈎薊馬 | 3000 | 21 | 1.0 | 十字花科蔬菜蚜蟲、水稻褐飛蝨 瓜類粉蝨、洋香瓜銀葉粉蝨、茶小綠葉蟬、梨木蝨、芒果葉蟬 |
| ■50%陶斯松可濕性粉劑 | IRAC 1B | | 2,000 | 12 | 1.0 | 甘藍紋白蝶、柑桔潛葉蛾、番石榴粉介殼蟲 |
| 42%益洛寧可濕性粉劑 | 益滅松 IRAC 1B 賽洛寧 IRAC 3A | | 1,500 | 9 | 益滅松 1.0 賽洛寧 1.0 | 番荔枝班螟蛾、龍眼、荔枝細蛾類 |
| ▲5%合芬寧膠囊懸著劑 | IRAC 3A | | 1,000 | 9 | 1.0 | 木瓜、茶神澤氏葉蟎；茶小綠葉蟬、茶葉蟎類、梨二點葉蟎 |
| ★20%亞滅培水溶性粉劑 | IRAC 4A | | 4000 | 9 | 1.0 | 十字花科蔬菜蚜蟲、十字花科蔬菜黃條葉蚤、瓜果類、印度棗、葡萄、柿、薔薇科果樹薊馬；茶小綠葉蟬、筴白筍長綠飛蝨、梨綠蚜、梨果類芽蟲、番茄銀葉粉蝨、番荔枝太平洋臀紋粉介殼蟲、蓮花小黃薊馬、蓮花斜紋夜蛾、芒果葉蟬、觀賞花卉銀葉粉蝨 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|------|----|--------------------|--|
| 10%克凡派水懸劑 | IRAC 13 | | 1500 | 12 | 0.5 | 十字花科蔬菜小菜蛾、小葉菜類、胡蘿蔔夜蛾、山藥黑盲椿象 洋香瓜南黃薊馬、韭菜、芒果薊馬類；茶葉蟬類、梨二點葉蟬 番茄、葡萄、茼蒿夜蛾；碗豆甜菜夜蛾 |
| ★9.6%益達胺溶液 | IRAC 4A | | 2000 | 9 | 1.0 | 毛豆、冬瓜、洋香瓜、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨；水稻斑飛蝨、褐飛蝨；瓜類、蔥科蔬菜葉部薊馬；瓜類粉蝨、印度棗薊馬類；西瓜、茄子、花胡瓜南黃薊馬；亞洲棕櫚象鼻蟲、玫瑰蚜蟲、柿斜紋夜蛾、薊馬類；茶黃薊馬、小綠葉蟬、柑桔刺粉蝨、筴白筍長綠飛蝨、梨木蝨、捲葉蚜、番荔枝姬黃薊馬；蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾；薔薇科果樹薊馬類、芒果綠葉蟬 |
| 21.5%免扶賽洛寧乳劑 | 免扶克 IRAC 1A 賽洛寧 IRAC 3A | | 1500 | 15 | 免扶克 0.1 賽洛寧 1.0 | |
| ●40%丁基加保扶可濕性粉劑 | IRAC 1A | | 1600 | 15 | 2.0 | 西瓜棉蚜、淡色薊馬；柑桔銹蟬 茄子二點小綠葉蟬、棉蚜；水稻褐飛蝨、負泥蟲；印度棗、柿薊馬類；柑桔捲葉蚜、大桔蚜、蚜蟲類；洋蔥蔥薊馬、唐菖蒲薊馬、梅圓介殼蟲、梨綠蚜、薔薇科果樹薊馬類 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|-------|----|--------------------|--|
| ●48.34%丁基加保扶乳劑 | IRAC 1A | | 1500 | 25 | 2.0 | 水稻褐飛蟲、印度棗、柿、柑桔、香蕉、芒果、薔薇科果樹薊馬類；西瓜淡色薊馬、莖藤粉介殼蟲、梨瘤蚜、番石榴薊馬類、番荔枝太平洋臀紋粉介殼蟲、葡萄赤腳青銅金龜 |
| ▲10%亞滅寧乳劑 | IRAC 3A | | 4000 | 6 | 2.0 | 印度棗、柿子、薔薇科果樹薊馬 |
| ▲10%亞滅寧水懸劑 | IRAC 3A | | 4000 | 6 | 2.0 | |
| 40%加保福化利可濕性粉劑 | 加保利 IRAC 1A 福化利 IRAC 3A | | 2000 | 14 | 加保利 0.5 福化利 1.0 | 茶小綠葉蟬、芒果綠葉蟬 |
| ▲25%福化利乳劑 | IRAC 3A | | 3000 | 18 | 1.0 | 瓜果類薊馬、菊花蚜蟲、蜜蜂蜂蟹蝨、蔥科蔬菜葉部薊馬 |
| ▲2.5%賽洛寧微乳劑 | IRAC 3A | | 2,000 | 6 | 1.0 | 十字花科蔬菜紋白蝶、斜紋夜蛾 |
| ▲2.46%賽洛寧膠囊懸著劑 | IRAC 3A | | 2,000 | 6 | 1.0 | 水稻瘤野螟、牛蒡、芹菜、仙草、豆菜、胡蘿蔔、馬鈴薯、茄果類、蕹菜、菠菜、菊科葉菜類夜蛾 |
| ▲2.8%賽洛寧乳劑 | IRAC 3A | | 2,000 | 6 | 1.0 | 瓜果類、印度棗、枇杷、柿、番石榴、碗豆、薔薇科果樹薊馬 西瓜南黃薊馬；豆菜類、茄科果菜毒蛾；枇杷小白紋毒蛾、柑桔潛葉蛾、茄子二點葉蝨、茄果類植食性瓢蟲；桃、梨果類葉蟬 茶小綠葉蟬、梨果類蚜蟲、莧菜、蕹菜、紫蘇葉蝨類；菜豆番茄斑潛蠅、葫蘆科瓜果夜蛾、植食性瓢蟲、金花蟲類；葉用甘藷夜蛾類、天蛾類、鳥羽蛾類；葡萄咖啡木蠹蛾、紅火蟻、 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|--|------|----|---|---|
| | | | | | 蔬菜番茄夜蛾；蔥科蔬菜葉部薊馬類、碗豆花薊馬、蕹菜小金花蟲、芒果葉蟬、羅勒葉蟎、夜蛾類；蘆筍夜蛾、毒蛾類（2.8%賽洛寧乳劑未推薦用於防治蘆筍夜蛾類、毒蛾類） | |
| ▲2.8%第滅寧水基乳劑 | IRAC 3A | | 1500 | 6 | 0.2 | 十字花科蔬菜小菜蛾、蚜蟲；小葉菜類蚜蟲、斑潛蠅；包葉菜類斑潛蠅、蚜蟲；玉米條背土蝗、瓜果類薊馬、印度棗小白紋毒蛾、台灣黃毒蛾；印度棗、柿、茄子、番石榴、薔薇科果樹薊馬類；西瓜淡色薊馬、芹菜、蔥科蔬菜、蕹菜、金針、藥用甘藷、羅勒、菊科蔬菜、菠菜蚜蟲類；芥菜番茄斑潛蠅、香蕉花薊馬、茶尺蠖蛾類、梨果類鱗翅目、番石榴黑疣粉蝨、楊桃花姬捲葉蛾 |
| ▲2.8%第滅寧乳劑 | IRAC 3A | | 1500 | 6 | 0.2 | 葡萄咖啡木蠹蛾、蔬菜南黃薊馬、番茄葉蛾 |
| ▲3%亞滅寧水基乳劑 | IRAC 3A | | 1000 | 6 | 2.0 | 印度棗、柿、番石榴、薔薇科果樹薊馬；茶小綠葉蟬、梨果類、桃、芒果葉蟬 |
| ▲3%亞滅寧乳劑 | IRAC 3A | | 1000 | 6 | 2.0 | |
| ★28.8%益達胺溶液 | IRAC 4A | | 6000 | 12 | 1.0 | 毛豆、冬瓜、洋香瓜、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨；水稻斑飛蝨、褐飛蝨；瓜類、蔥科蔬菜葉部薊馬；瓜類粉蝨、印度棗薊馬類；西瓜、茄子、花胡瓜南黃薊馬；亞洲棕櫚象鼻蟲、玫瑰蚜蟲、柿斜紋夜蛾、薊馬類；茶黃薊馬、小綠葉蟬、柑桔刺粉蝨、筴白筍長綠飛蝨、梨木蝨、捲葉蚜、番荔枝姬黃薊馬；蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾；薔薇科果樹薊馬類、芒果綠葉蟬 |
| ★20%達特南水溶性粒 | IRAC 4A | | 3000 | 9 | 1.0 | 十字花科蔬菜之黃條葉蚤、銀葉粉蝨、蚜蟲； |

| | | | | | | |
|----------------|---------|------|------|----|-----------------|---|
| 劑 | | | | | | 水稻褐飛蟲；番石榴、印度棗、柿子粉介殼蟲與薊馬；瓜類粉蝨、金花蟲；芒果、蓮霧、印度棗、番石榴葉蟬 |
| 11.7%賜諾特水懸劑 | IRAC 5 | | 3000 | 6 | 十字花科蔬菜 菜 2.0 | 十字花科蔬菜小菜蛾、夜蛾、紋白蝶、毒蛾、菜心螟、植食性瓢蟲；落花生葉蛾、毒蛾、天蛾、螟蛾；芒果薊馬、洋香瓜斑潛蠅、玉米穗夜蛾、中國梨木蝨 |
| ▲2.5%賽洛寧微乳劑 | IRAC 3A | | 2000 | 6 | 1.0 | 十字花科蔬菜紋白蝶、斜紋夜蛾 |
| ▲2.46%賽洛寧膠囊懸著劑 | IRAC 3A | | 2000 | 6 | 1.0 | 水稻瘤野螟、牛蒡、芹菜、仙草、豆菜、胡蘿蔔、馬鈴薯、茄果類、蕹菜、菠菜、菊科葉菜類夜蛾 |
| ▲2.8%賽洛寧乳劑 | IRAC 3A | | 2000 | 6 | 1.0 | 瓜果類、印度棗、枇杷、柿、番石榴、碗豆、薔薇科果樹薊馬 西瓜南黃薊馬；豆菜類、茄科果菜毒蛾；枇杷小白紋毒蛾、柑桔潛葉蛾、茄子二點葉蟎、茄果類植食性瓢蟲；桃、梨果類葉蟬 茶小綠葉蟬、梨果類蚜蟲、莧菜、蕹菜、紫蘇葉蟎類；菜豆番茄斑潛蠅、葫蘆科瓜果夜蛾、植食性瓢蟲、金花蟲類；葉用甘藷夜蛾類、天蛾類、烏羽蛾類；葡萄咖啡木蠹蛾、紅火蟻、蔬菜番茄夜蛾；蔥科蔬菜葉部薊馬類、碗豆花薊馬、蕹菜小金花蟲、芒果葉蟬、羅勒葉蟎、夜蛾類；蘆筍夜蛾、毒蛾類（2.8%賽洛寧乳劑未推薦用於防治蘆筍夜蛾類、毒蛾類） |
| ★25%賽速安水溶性粒 | IRAC 4A | 小綠葉蟬 | 7500 | 12 | 0.5 | 十字花科蔬菜、芹菜、菠菜、菊科蔬菜、葉用 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--|------|----|------------------------------------|--|
| 劑 | | | | | 甘藷、蕹菜、羅勒蚜蟲；毛豆銀葉粉蝨、茶小綠葉蟬、柑桔捲葉蚜、芒果葉蟬 | |
| 20%矽護芥可濕性粉劑 | IRAC 3 | | 2000 | 12 | 2.0 | 芒果葉蟬 |
| 40%加保福化利可濕性粉劑 | 加保利 IRAC 1A 福化利 IRAC 3A | | 2000 | 18 | 加保利 0.5 福化利 1.0 | 茶小綠葉蟬、芒果綠葉蟬 |
| ▲2.9%貝他賽扶寧乳劑 | IRAC 3A | | 1500 | 6 | 0.5 | 水稻稻螟蛉、瘤野螟、台灣夜盜、樹蔭蝶；西瓜南黃薊馬、蔥科蔬菜葉部薊馬類、芒果葉蟬 |
| ▲20%亞滅培水溶性粉劑 | IRAC 3A | | 4000 | 12 | 1.0 | 十字花科蔬菜蚜蟲、十字花科蔬菜黃條葉蚤、瓜果類、印度棗、葡萄、柿、薔薇科果樹薊馬；茶小綠葉蟬、筴白筍長綠飛蝨、梨綠蚜、梨果類芽蟲、番茄銀葉粉蝨、番荔枝太平洋臀紋粉介殼蟲、蓮花小黃薊馬、蓮花斜紋夜蛾、芒果葉蟬、觀賞花卉銀葉粉蝨 |
| ▲3%亞滅寧水基乳劑 | IRAC 3A | | 1000 | 6 | 2.0 | 印度棗、柿、番石榴、薔薇科果樹薊馬；茶小綠葉蟬、梨果類、桃、芒果葉蟬 |
| ▲3%亞滅寧乳劑 | IRAC 3A | | 1000 | 6 | 2.0 | |
| 42%益洛寧可濕性粉劑 | 益滅松 IRAC 1B 賽洛寧 IRAC 3A | | 2000 | 9 | 益滅松 1.0 賽洛寧 1.0 | 番荔枝班螟蛾、龍眼、荔枝細蛾類 |
| ★9.6%益達胺溶液 | IRAC 4A | | 3000 | 9 | 1.0 | 毛豆、冬瓜、洋香瓜、花椰菜、芥藍銀葉粉蝨； |
| ★9.6%益達胺水懸劑 | IRAC 4A | | 3000 | 9 | 1.0 | 水稻斑飛蝨、褐飛蝨；瓜類、蔥科蔬菜葉部薊馬；瓜類粉蝨、印度棗薊馬類；西瓜、茄子、 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|-------|----|--------------------------|---|
| | | | | | | 花胡瓜南黃薊馬；亞洲棕櫚象鼻蟲、玫瑰蚜蟲、柿斜紋夜蛾、薊馬類；茶黃薊馬、小綠葉蟬、柑桔刺粉蝨、筴白筍長綠飛蝨、梨木蝨、捲葉蚜、番荔枝姬黃薊馬；蓮花小黃薊馬、斜紋夜蛾；薔薇科果樹薊馬類、芒果綠葉蟬 |
| ▲2.8%畢芬寧乳劑 | IRAC 3A | | 2000 | 9 | 1.0 | 十字花科蔬菜斜紋夜蛾、小葉菜類粉蝨與葉蛾、包葉菜類粉蝨與葉蛾、甘藍紋白蝶、西瓜二點葉蟎、豆菜薊馬與蚜蟲、杭菊薊馬與蚜蟲、果菜蚜蟲、葉蟎與二點小綠葉蟬、花椰菜銀葉粉蝨、茄子葉蟎、二點小綠葉蟬、茶姬捲葉蛾、小綠葉蟬與葉蟎、梨果類葉蟎與蚜蟲、番石榴與芒果之葉蟬與薊馬、 |
| ▲2.5%畢芬寧水懸劑 | IRAC 3A | | 2000 | 9 | 1.0 | 十字花科蔬菜斜紋夜蛾、小葉菜類粉蝨與葉蛾、包葉菜類粉蝨與葉蛾、甘藍紋白蝶、西瓜二點葉蟎、豆菜薊馬與蚜蟲、杭菊薊馬與蚜蟲、果菜蚜蟲、葉蟎與二點小綠葉蟬、花椰菜銀葉粉蝨、茄子葉蟎、二點小綠葉蟬、茶姬捲葉蛾、小綠葉蟬與葉蟎、梨果類葉蟎與蚜蟲、番石榴與芒果之葉蟬與薊馬、 |
| 75%第滅達胺水分散性粒劑 | 第滅寧 IRAC 3A 益達胺 IRAC 4A | | 10000 | 25 | 第滅寧 0.2 益達胺 1.0 | 芒果葉蟬 |
| ▲20%達特南水溶性粒劑 | IRAC 3A | | 3000 | 9 | 1.0 | 十字花科蔬菜之黃條葉蚤、銀葉粉蝨、蚜蟲；水稻褐飛蝨；番石榴、印度棗、柿子粉介殼蟲與薊馬；瓜類粉蝨、金花蟲；芒果、蓮霧、印度棗、番石榴葉蟬 |
| ▲2.46%賽洛寧膠囊懸著劑 | IRAC 3A | | 4000 | 6 | 1.0 | 十字花科蔬菜紋白蝶、斜紋夜蛾 |
| ▲2.5%賽洛寧微乳劑 | IRAC 3A | | 4000 | 6 | 1.0 | 水稻瘤野螟、牛蒡、芹菜、仙草、豆菜、胡蘿蔔、馬鈴薯、茄果類、蕹菜、菠菜、菊科葉菜 |

| | | | | | | |
|---------------|---------|-------|------|----|-----|--|
| ▲2.8%賽洛寧乳劑 | IRAC 3A | | 4000 | 6 | 1.0 | 類夜蛾 瓜果類、印度棗、枇杷、柿、番石榴、碗豆、薔薇科果樹薊馬 西瓜南黃薊馬；豆菜類、茄科果菜毒蛾；枇杷小白紋毒蛾、柑桔潛葉蛾、茄子二點葉蟎、茄果類植食性瓢蟲；桃、梨果類葉蟬 茶小綠葉蟬、梨果類蚜蟲、莧菜、蕹菜、紫蘇葉蟎類；菜豆番茄斑潛蠅、葫蘆科瓜果夜蛾、植食性瓢蟲、金花蟲類；葉用甘藷夜蛾類、天蛾類、烏羽蛾類；葡萄咖啡木蠹蛾、紅火蟻、蔬菜番茄夜蛾；蔥科蔬菜葉部薊馬類、碗豆花薊馬、蕹菜小金花蟲、芒果葉蟬、羅勒葉蟎、夜蛾類；蘆筍夜蛾、毒蛾類（2.8%賽洛寧乳劑未推薦用於防治蘆筍夜蛾類、毒蛾類） |
| 11%百利普芬乳劑 | IRAC 7C | 粉介殼蟲 | 1500 | 9 | 0.5 | 瓜果類粉蝨、柿柑桔粉介殼蟲、番石榴粉介殼蟲、蘇鐵白輪盾介殼蟲 |
| ■75%陶斯松水分散性粒劑 | IRAC 1B | | 3000 | 12 | 1.0 | 甘藍紋白蝶、柑桔潛葉蛾、番石榴粉介殼蟲 |
| ■50%陶斯松可濕性粉劑 | IRAC 1B | | 2000 | 12 | 1.0 | |
| ▲2.9%貝他賽扶寧乳劑 | IRAC 3A | 圓紋捲葉蛾 | 1000 | 6 | 0.5 | 水稻稻螟蛉、瘤野螟、台灣夜盜、樹蔭蝶；西瓜南黃薊馬、蔥科蔬菜葉部薊馬類、芒果葉蟬 |
| ▲5%賽扶寧水基乳劑 | IRAC 3A | 東方果實蠅 | 1600 | 15 | 0.5 | 包葉菜類、玫瑰蚜蟲、芥菜偽菜蚜 |
| ▲10%芬普寧水懸劑 | IRAC 3A | 葉蟎類 | 1000 | 9 | 0.5 | 木瓜、柑桔、印度棗、香蕉、草莓、楊桃、龍 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|--|------|---|-----|---|
| | | | | | | 眼、芒果、番石榴、茶、梨果、荔枝、酪梨等果樹葉蟎、十字花科蔬菜小菜蛾、茶小綠葉蟬 |
| 1%密滅汀乳劑 | IRAC 6 | | 1500 | 6 | 0.2 | 十字花科蔬菜、木瓜、水蜜桃、瓜果類、印度棗、西瓜、果菜、玫瑰、芹菜、柑桔、茶、番石榴、梨果、甘藷、羅勒等作物蚜蟲與葉蟎 |
| 10%得芬瑞可濕性粉劑 | IRAC 21A | | 2000 | 7 | 0.5 | 木瓜、柑桔、印度棗、香蕉、草莓、楊桃、龍眼、芒果、番石榴、茶、荔枝、酪梨等果樹葉蟎 |

備註：藥劑名稱前方之圖案相同者代表具有相同作用機制，應避免同時使用，也避免輪替使用。